

AC

ドキシソルビシン	60mg/m ²	点滴静注 (Day1)
シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注 (Day1)
3週間毎	*4コース	

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15
ドキシソルビシン	DIV	60mg/m ²	↓		
シクロホスファミド	DIV	600mg/m ²	↓		

★ドキシソルビシンによる吐き気・心機能障害などに注意。尿が赤くなることがあります。

★シクロホスファミドによる出血性膀胱炎に注意。

Atezo+Nab-PTX

アテゾリズマブ	840mg/body	点滴静注 (Day1、15)
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100mg/m ²	点滴静注 (Day1、8、15)
4週間毎		

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15	Day22
アテゾリズマブ	DIV	840mg/body	↓		↓	
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	DIV	100mg/m ²	↓	↓	↓	

★アテゾリズマブは免疫チェックポイント阻害剤のため、irAEに注意する。

★パクリタキセル (アルブミン懸濁型) は血液製剤 (アルブミン製剤) であることに注意。

※2022年4月現在納品難しい状況が続いている

Bmab+PTX

ベバシズマブ	10mg/kg	点滴静注 (Day1、15)
パクリタキセル	90mg/m ²	点滴静注 (Day1、8、15)
4週間毎		

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15	Day22
ベバシズマブ	DIV	10mg/kg	↓		↓	
パクリタキセル	DIV	90mg/m ²	↓	↓	↓	

★ベバシズマブは血管新生阻害剤のため、出血・創傷治癒遅延・血栓・蛋白尿など注意。

★パクリタキセルはアルコール含有していることに注意。

Cap+T-mab

カペシタビン	1657mg/m ² /日	経口投与 (Day1夕～Day22朝)
トラスツズマブ	【初回】 4mg/kg 【2回目以降】 2mg/kg	点滴静注 (Day1、 8、 15、 22)
4週間毎		

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15	Day22
カペシタビン	PO	1657mg/m ² /日	→	→	→	
トラスツズマブ	DIV	【初回】 4mg/kg 【2回目以降】 2mg/kg	↓	↓	↓	↓

★カペシタビンによる手足症候群に注意。

★トラスツズマブによる心機能障害に注意。

CMF

シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注 (Day1、8)
メトトレキサート	40mg/m ²	点滴静注 (Day1、8)
5-フルオロウラシル	600mg/m ²	点滴静注 (Day1、8)
4週間毎	*6コース	

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15	Day22
シクロホスファミド	DIV	600mg/m ²	↓	↓		
メトトレキサート	DIV	40mg/m ²	↓	↓		
5-フルオロウラシル	DIV	600mg/m ²	↓	↓		

★シクロホスファミドによる出血性膀胱炎に注意。

dosedenseAC

ドキシソルビシン	60mg/m ²	点滴静注 (Day1)
シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注 (Day1)
2週間毎 *4コース	★Day2~4 のどこかでペグフィルグラスチム皮下注投与	

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8
ドキシソルビシン	DIV	60mg/m ²	↓	
シクロホスファミド	DIV	600mg/m ²	↓	

★ドキシソルビシンによる吐き気・心機能障害などに注意。尿が赤くなることがあります。

★シクロホスファミドによる出血性膀胱炎に注意。

dosedensePTX

パクリタキセル 175mg/m² 点滴静注 (Day1)
2週間毎 *4コース ★Day2~4 のどこかでペグフィルグラスチム皮下注投与

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8
パクリタキセル	DIV	175mg/m ²	↓	

★パクリタキセルはアルコール含有していることに注意。

DTX

ドセタキセル 60mg/m² 点滴静注 (Day1)
3週間毎

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15
ドセタキセル	DIV	60mg/m ²	↓		

★ ドセタキセルによる浮腫・手足症候群などに注意

EC

エピルビシン	85mg/m ²	点滴静注 (Day1)
シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注 (Day1)
3週間毎		

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15
エピルビシン	DIV	85mg/m ²	↓		
シクロホスファミド	DIV	600mg/m ²	↓		

★エピルビシンによる吐き気・心機能障害などに注意。尿が赤くなる。

★シクロホスファミドによる出血性膀胱炎に注意。

GEM+PTX

ゲムシタビン	1250mg/m ²	点滴静注 (Day1、8)
パクリタキセル	175mg/m ²	点滴静注 (Day1)
3週間毎		

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15
ゲムシタビン	DIV	1250mg/m ²	↓	↓	
パクリタキセル	DIV	175mg/m ²	↓		

- ★パクリタキセルはアルコール含有していることに注意。
- ★胸部への放射線療法・間質性肺炎・肺線維症がある患者には禁忌。

GEM+weeklyPTX

ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 (Day1、8)
パクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注 (Day1、8)
3週間毎		

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15
ゲムシタビン	DIV	1000mg/m ²	↓	↓	
パクリタキセル	DIV	100mg/m ²	↓	↓	

- ★パクリタキセルはアルコール含有していることに注意。
- ★胸部への放射線療法・間質性肺炎・肺線維症がある患者には禁忌。

HAL

エリブリン 1.4mg/m² 点滴静注 (Day1、8)
3週間毎

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15
エリブリン	DIV	1.4mg/m ²	↓	↓	

★アルコール過敏の患者には注意。

★吐き気・脱毛・口内炎・末梢神経傷害に注意。

Nab-PTX単独

パクリタキセル（アルブミン懸濁型） 260mg/m² 点滴静注（Day1）
3週間毎

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15
パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	DIV	260mg/m ²	↓		

- ★ 血液製剤（アルブミン製剤）であることに注意
2022年4月現在納品難しい状況が続いている

Pembro単剤（術後補助）

ペムブロリズマブ 200mg/body 点滴静注（Day1）
3週間毎 9コースまで

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15
ペムブロリズマブ	DIV	200mg/body	↓		

★irAEに注意

Pembro + AC

ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 (Day1)
ドキシソルビシン	60mg/m ²	点滴静注 (Day1)
シクロフォスファミド	600mg/m ²	点滴静注 (Day1)
3週間毎 4コースまで		

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15
ペムブロリズマブ	DIV	200mg/body	↓		
ドキシソルビシン	DIV	60mg/m ²	↓		
シクロフォスファミド	DIV	600mg/m ²	↓		

★irAEに注意

★ドキシソルビシンによる吐き気・心機能障害などに注意。尿が赤くなることがあります。

★シクロホスファミドによる出血性膀胱炎に注意。

Pembro + GEM + CBDCA

ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 (Day1)
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 (Day1、8)
カルボプラチン	AUC=2	点滴静注 (Day1、8)
3週間毎	PD-L1陽性のみ (CPS > 10)	

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15
ペムブロリズマブ	DIV	200mg/body	↓		
ゲムシタビン	DIV	1000mg/m ²	↓	↓	
カルボプラチン	DIV	AUC=2	↓	↓	

★irAEに注意

★カルボプラチンは腎機能により投与量調節

Pembro + weeklyPTX+weeklyCBDCA

ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 (Day1)
パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注 (Day1、8、15)
カルボプラチン	AUC=1.5	点滴静注 (Day1、8、15)
3週間毎 4コースまで		

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15
ペムブロリズマブ	DIV	200mg/body	↓		
パクリタキセル	DIV	80mg/m ²	↓	↓	↓
カルボプラチン	DIV	AUC=1.5	↓	↓	↓

★irAEに注意

★パクリタキセルはアルコール含有していることに注意。

★カルボプラチンは腎機能により投与量調節

TC

ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注 (Day1)
シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注 (Day1)

3週間毎 *4コース

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15
ドセタキセル	DIV	75mg/m ²	↓		
シクロホスファミド	DIV	600mg/m ²	↓		

★ドセタキセルによる浮腫・手足症候群などに注意

★シクロホスファミドによる出血性膀胱炎に注意。

T-DM1

トラスツズマブエムタンシン 3.6mg/kg 点滴静注 (Day1)

3週間毎

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15
トラスツズマブエムタンシン	DIV	3.6mg/kg	↓		

★間質性肺炎など肺臓炎に注意。

T-mab+DTX

トラスツズマブ	【初回】 8mg/kg	点滴静注 (Day1)
	【2回目以降】 6mg/kg	
ドセタキセル	60mg/m ²	点滴静注 (Day1)
3週間毎	* 4コース	

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15
トラスツズマブ	DIV	【初回】 8mg/kg 【2回目以降】 6mg/kg	↓		
ドセタキセル	DIV	60mg/m ²	↓		

★トラスツズマブによる心機能障害に注意。

★ドセタキセルによる浮腫・手足症候群などに注意

T-mab+ペルツズマブ+DTX併用

ペルツズマブ	【初回】 840mg/body	点滴静注 (Day1)
	【2回目以降】 420mg/body	
トラスツズマブ	【初回】 8mg/kg	点滴静注 (Day1)
	【2回目以降】 6mg/kg	
ドセタキセル	60mg/m ²	点滴静注 (Day1)
3週間毎		

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15
ペルツズマブ	DIV	【初回】 840mg/body 【2回目以降】 420mg/body	↓		
トラスツズマブ	DIV	【初回】 8mg/kg 【2回目以降】 6mg/kg	↓		
ドセタキセル	DIV	60mg/m ²	↓		

★トラスツズマブによる心機能障害に注意。

★ドセタキセルによる浮腫・手足症候群などに注意

weeklyPTX

パクリタキセル 80mg/m² 点滴静注 (Day1)
1週間毎 *12コース

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15	Day22
パクリタキセル	DIV	80mg/m ²	↓	↓	↓	↓

★パクリタキセルはアルコール含有していることに注意。

weeklyPTX+weeklyT-mab

パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注 (Day1、8、15)
トラスツズマブ	【初回】 4mg/kg 【2回目以降】 2mg/kg	点滴静注 (Day1、8、15、22)
4週間毎		

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15	Day22
パクリタキセル	DIV	80mg/m ²	↓	↓	↓	
トラスツズマブ	DIV	【初回】 4mg/kg 【2回目以降】 2mg/kg	↓	↓	↓	↓

★パクリタキセルはアルコール含有していることに注意。

★トラスツズマブによる心機能障害に注意。

XC

カペシタビン	2400mg/body/日	経口投与 (Day1~Day14)
シクロホスファミド	100mg/body/日	経口投与 (Day1~Day14)
3週間毎		

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15
カペシタビン	PO	2400mg/body/日	→	→	
シクロホスファミド	PO	100mg/body/日	→	→	

- ★カペシタビンによる手足症候群に注意。
- ★シクロホスファミドによる出血性膀胱炎に注意。