

# GC

ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 (Day1、8)
シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 (Day1、8)
3週間毎		

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15
ゲムシタビン	DIV	1000mg/m <sup>2</sup>	↓	↓	
シスプラチン	DIV	25mg/m <sup>2</sup>	↓	↓	

★シスプラチン投与のため、腎機能障害予防に水分負荷・Mg製剤の投与など必要。

★胸部への放射線療法・間質性肺炎・肺線維症がある患者には禁忌。

# GS

ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 (Day1、8)
S-1	60mg/m <sup>2</sup>	経口投与 (Day1夕～15朝)
※S-1の投与量 体表面積: (1.25m <sup>2</sup> > ) = 60m g (1.25～1.5m <sup>2</sup> ) = 80m g (1.5m <sup>2</sup> < ) = 100m g		
3週間毎		

薬剤名	投与方法	標準投与量	Day1	Day8	Day15
ゲムシタビン	DIV	1000mg/m <sup>2</sup>	↓	↓	
S-1	PO	60mg/m <sup>2</sup>	→	→	

★胸部への放射線療法・間質性肺炎・肺線維症がある患者には禁忌。